

# PARVULAN

*Corynebacterium parvum*

Imunomodulador

Forma Farmacêutica: Suspensão Injetável

Via de Administração: USO SUBCUTÂNEO – SC

## APRESENTAÇÕES

Frasco ampola de vidro âmbar, com 5 mL da suspensão, contendo 2 mg / mL.

## USO ADULTO E PEDIÁTRICO

### COMPOSIÇÃO

Cada mL de Parvulan contém:

*Corynebacterium Parvulan*..... 2 mg

Excipientes: Água para Injetáveis, Fenol e Cloreto de Sódio.

## INFORMAÇÕES AO PACIENTE

### 1- PARA QUE ESTE MEDICAMENTO FOI INDICADO?

Parvulan é indicado no tratamento da baixa resistência imunológica e doenças de pele como verrugas comuns, coadjuvante para hanseníase e lepra lepromatosa. Parvulan também é utilizado como coadjuvante no tratamento de alergias (imunoterapia).

### 2- COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

Parvulan age diretamente na estimulação do sistema imunológico, aumentando as defesas imunológicas do organismo.

### 3- QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Parvulan é contra indicado para pacientes com hipersensibilidade conhecida aos componentes da fórmula.

Pacientes portadores de doenças auto-imunes devem consultar seu médico antes do uso deste medicamento.

Informar ao médico caso de gravidez, amamentação ou se ocorrer gravidez durante o tratamento.

### 4- O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista**

Siga a orientação do seu médico, respeitando os horários, as doses e a duração do tratamento.

Em caso de dúvidas, informar ao seu médico o aparecimento de reações

desagradáveis. Não existem relatos sobre interação medicamentosa dos componentes da fórmula com outros medicamentos, alimentos, plantas medicinais e nos exames laboratoriais.

**Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.**

**Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.**

**Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.**

### 5-ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Deve ser conservado na embalagem original em local seco, ao abrigo da luz direta e em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C. Após aberto, conservar em geladeira, entre 2°C e 8°C. Parvulan pode ser

armazenado por 36 meses.

**Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.**

**Não use medicamento com prazo de validade vencido.**

**Para sua segurança, mantenha o medicamento na embalagem original.**

**Depois de aberto, este medicamento pode ser utilizado até o fim do seu prazo de validade.**

Parvulan é apresentado como é apresentado como suspensão, de coloração leitosa a branca.

**Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso você observe alguma mudança no aspecto do medicamento que ainda esteja no prazo de validade, consulte o médico ou o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.**

**Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.**

## 6- COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

### 6.1. Encher a seringa com o medicamento a partir do frasco-ampola

– Agite bem o frasco

– Retire a parte central do selo de alumínio.


– Realize assepsia do local com álcool.

– Retire a capa de proteção da agulha e espete seringa na tampa de borracha.

– Vire o frasco-ampola de cabeça para baixo.

– Puxe o êmbolo para trás para retirar o medicamento do frasco, aspirando para dentro da seringa até o volume desejado.


– Coloque a capa de proteção de volta na agulha e repouse a seringa.



### PREPARAR O LOCAL DA INJEÇÃO E APLICAR O MEDICAMENTO

#### 6.2. Remover as bolhas de ar

– Para remover as bolhas de ar, bata de leve na seringa até que todo o ar vá para a parte superior – em seguida, pressione lentamente o êmbolo até que todas as bolhas de ar tenham sido expelidas.



#### 6.3. Limpar o local de injeção

– Escolha um local para a injeção na parte posterior do braço.


– Limpe a pele do local de aplicação da injeção com o segundo lenço umedecido em álcool, utilizando movimentos circulares.

#### 6.4. Introduzir a agulha na pele

– Segure a seringa com uma mão, como se estivesse segurando uma caneta.

– Com a outra mão faça suavemente uma prega na pele, segurando-a firmemente.

- Com cuidado, introduza a agulha cinza completamente na pele num ângulo de aproximadamente 45 a 90°. Em seguida, solte a pele.
- Empurrar lentamente o êmbulo aplicando todo o volume contido na seringa.
- Retirar cuidadosamente a seringa da pele.
- Realizar assepsia local com anti-séptico adequado.



**Adultos:** Doses semanais (a cada 7 dias). Iniciando com dose de 0,1 mL, seguindo para 0,2 mL, 0,3 mL, 0,4 mL e 0,5 mL. Após, manter dose de 0,5 mL até o final do frasco.

**Crianças:** A partir de 2 anos. Doses semanais (a cada 7 dias). Iniciando com dose de 0,05 mL, seguindo para 0,1 mL, 0,15 mL, 0,2 mL e 0,25 mL. Após, manter dose de 0,25 mL até o final do frasco.

Utilizar seringa estéril de 1 mL com agulha 12,7 ou 13 mm.

Via de Administração: Uso subcutâneo - SC

**Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.**

**Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.**

#### **7-O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Se houver omissão de uma dose, é recomendado aplicar outra assim que lembrar e dar continuidade ao tratamento mantendo o intervalo inado entre as doses. Não se deve dobrar a dose.

**Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico.**

#### **8-QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?**

O produto é bem tolerado e não há relatos de reações adversas.

**Informe ao seu médico ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.**

#### **9-O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTES MEDICAMENTOS?**

Não há relatos de superdosagem com Parvulan.

**Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível.**

**Em caso de intoxicação ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações sobre como proceder.**



Fabricado por:

**Laboratório Extratos Alergênicos Ltda.**

Av. Rio Branco, 277 Gr. 1201 - Rio de Janeiro-RJ

CNPJ: 28.614.626/0001-07

Reg. MS. 1.1729.0006

Farmacêutica Responsável:

M. Queiroz da Cruz – CRF-RJ 1560

Serviço de Atendimento ao Consumidor

(SAC): (21) 2262-4360/2220-4763

**Venda sob prescrição médica**

