

## TIMULINA

**Extrato de Células Tímicas**

Imunomodulador
Forma Farmacêutica: Pó Liófilo + Solução Diluente
Via de Administração: USO SUBCUTÂNEO PROFUNDO - SC

### APRESENTAÇÃO

Frasco ampola de vidro âmbar com 2 mg de extrato de células tímicas liofilizado, mais ampola de vidro incolor com 1 mL de Solução Diluente.

<b>USO ADULTO E PEDIÁTRICO</b>
--------------------------------

<b>COMPOSIÇÃO</b>
-------------------

Cada frasco-ampola de uso único contém 2 mg de pó liofilizado de extrato de células tímicas para solução injetável.

Excipientes: Manitol e Cloreto de Sódio
Diluente: Cada ampola de Diluente contém 1 mL de Água pra Injeção.

### INFORMAÇÕES AO PACIENTE

Excipientes: Manitol e Cloreto de Sódio
Diluente: Cada ampola de Diluente contém 1 mL de Água pra Injeção.

### INFORMAÇÕES AO PACIENTE

#### 1- PARA QUE ESTE MEDICAMENTO FOI INDICADO?

Timulina é um imunomodulador e atua no tratamento de baixa resistência imunológica.

#### 2- COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

Timulina é um medicamento utilizado no tratamento da baixa imunidade e atua na diferenciação de linfócitos, formando plasmócitos e sintetizando anticorpos específicos, aumentando assim as defesas do organismo.

#### 3- QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Este medicamento é contra indicado para pacientes com hipersensibilidade conhecida aos componentes da fórmula.

Pacientes transplantados ou portadores de doenças autoimunes não devem fazer uso deste medicamento.

Informar ao médico caso de gravidez, amamentação ou se ocorrer gravidez durante o tratamento.

#### 4- O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Siga a orientação do seu médico, respeitando os horários, as doses e a duração do tratamento.

Em caso de dúvidas, informar ao seu médico o aparecimento de reações desagradáveis. Não existem relatos sobre interação medicamentosa dos componentes da fórmula com outros medicamentos, alimentos, plantas medicinais e nos exames laboratoriais.

**Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico. Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.**

**Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.**

#### 5-ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Deve ser conservado na embalagem original em local seco, ao abrigo da luz direta e em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C. Desde que respeitadas as condições de armazenamento, este medicamento pode ser guardado pelo tempo do seu prazo de validade, 36 meses. Após reconstituído, o medicamento deve ser todo utilizado, não sendo recomendado seu armazenamento.

**Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem. Não use medicamento com prazo de validade vencido.**

**Para sua segurança, mantenha o medicamento na embalagem original.**

**Depois de aberto, este medicamento pode ser utilizado até o fim do seu prazo de validade.**

Características do medicamento: Timulina é apresentado como pó branco + diluente límpido e incolor. Após reconstituição, o medicamento se apresenta como solução límpida e de coloração incolor à levemente castanha.

**Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso você observe alguma mudança no aspecto do medicamento que ainda esteja no prazo de validade, consulte o médico ou o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.**

**Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.**

#### 6- COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Este medicamento foi prescrito especialmente para você; portanto, não permita que outras pessoas o utilizem. Utilize cada agulha, frasco-ampola e seringa apenas uma única vez.

#### 6.1. Antes de administrar o medicamento

- Lave as suas mãos

É importante que as suas mãos e todos os utensílios que você vai utilizar estejam os mais limpos possíveis.

#### 6.2. Coloque tudo o que vai precisar sobre uma superfície limpa:

– O frasco-ampola contendo o pó liofilizado;

– A ampola contendo o diluente;

– Uma seringa estéril e descartável;

– Algodão ou gaze umedecidos em álcool.

#### 6.3. Misturando o Pó e o diluente para preparar seu medicamento

Retirar toda parte central do lacre do frasco ampola de diluente – Por baixo da tampa plástica existe uma tampa de borracha não a retire do frasco.


– Limpe o anel de alumínio e a tampa de borracha com o algodão ou gaze umedecidos em álcool.

– Para abrir a ampola com diluente, quebre o bico da ampola na marcação circular.

– Com auxílio da seringa, retirar todo volume de água contido na ampola (1mL).

– Injete a água no frasco-ampola, pressionando lentamente o êmbolo da seringa para baixo. Não utilize nenhum outro tipo de água.

– Deixe a seringa na tampa de borracha.



#### 6.4. Misturar o pó e a água no frasco-ampola

– Segurando cuidadosamente o frasco e a seringa, agite suavemente para misturar o pó e a água. Uma vez misturados, verifique se a solução está límpida e sem partículas.

#### 6.5. Encher novamente a seringa com o medicamento a partir do frasco-ampola

– Virar o frasco-ampola de cabeça para baixo.

– Puxe o êmbolo para trás para retirar o medicamento do frasco, aspirando para dentro da seringa.

– Se ficar alguma solução no frasco-ampola, puxe a agulha para trás até que a abertura da agulha esteja bem próxima do interior da tampa de borracha. Se você olhar pela lateral através do espaço na tampa de borracha, poderá controlar o movimento da agulha e do líquido.

– Certifique-se de que aspirou todo o conteúdo do frasco-ampola.



#### 6.6. Remover as bolhas de ar

– Segure a seringa com a agulha virada para cima e verifique se existem bolhas de ar.

– Para remover as bolhas de ar, bata de leve na seringa até que todo o vá para a parte superior – em seguida, pressione lentamente o êmbolo até que todas as bolhas de ar tenham sido expelidas.




#### 6.7. Limpar o local de injeção

- Escolha um local para a injeção na parte posterior do braço.
- Limpe a pele do local de aplicação da injeção com algodão ou gaze umedecidos em álcool, utilizando movimentos lineares.

#### 6.8. Introduzir a agulha na pele

- Segure a seringa com uma mão, como se estivesse segurando uma caneta.
- Com a outra mão faça suavemente uma prega na pele, segurando-a firmemente.
- Com cuidado, introduza a agulha cinza completamente na pele num ângulo de aproximadamente 45 a 90°. Em seguida, solte a pele.
- Empurrar lentamente o êmbulo aplicando todo o volume contido na seringa.
- Retirar cuidadosamente a seringa da pele.



**Uso Adulto** – Após reconstituição, aplicar volume total (1 mL). Timulina deve ser aplicado por via Subcutânea profunda de 7/7 dias ou a critério do médico assistente (10/10 dias ou 15/15 dias, dias alternados ou diariamente). A duração do tratamento fica a critério médico.

**Uso Pediátrico** - Após reconstituição, aplicar metade do volume total (0,5 mL). Timulina deve ser aplicado por via Subcutânea profunda de 7/7 dias ou a critério do médico assistente (10/10 dias ou 15/15 dias, dias alternados ou diariamente). A duração do tratamento fica a critério médico.

Utilizar seringas estéreis descartáveis.

Via de Administração: Uso subcutâneo profundo - SC

Este esquema poderá ser modificado de acordo com o médico assistente.

**Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.**

**Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.**

#### 7-O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Dose omitida: Se houver omissão de uma dose, é recomendado aplicar outra assim que lembrar e dar continuidade ao tratamento mantendo o intervalo determinado entre as doses. Solicite sempre orientação do médico assistente.

**Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico.**

#### 8-QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Não são conhecidas a intensidade e frequência das reações adversas. Nos vários experimentos já realizados, e baseados na experiência

clínica o produto demonstrou ser atóxico e desprovido de efeitos colaterais.

**Informe ao seu médico ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento.**

**Informe a empresa sobre o aparecimento de reações indesejáveis e problemas com este medicamento, entrando em contato através do Sistema de Atendimento ao Consumidor (SAC).**

#### 9-O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTES MEDICAMENTO?

Em caso de superdose acidental, procure imediatamente o atendimento do médico assistente.

**Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível.**

**Em caso de intoxicação ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações sobre como proceder.**



Fabricado por:

**Laboratório Extratos Alergênicos Ltda.**

Av. Rio Branco, 277 Gr. 1201 - Rio de Janeiro-RJ

CNPJ: 28.614.626/0001-07

Reg. MS. 1.1729.0005

Farmacêutica Responsável:

M. Queiroz da Cruz – CRF-RJ 1560

Serviço de Atendimento ao Consumidor

(SAC): (21) 2262-4360/2220-4763

**Venda sob prescrição médica**

